





		1病日	21病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	 休薬完了21日目 婦人科83 子宮体癌 レンパチニブ+Pembro	
		がん免疫療法の副作用についての説明書・同意書	
		 ※レンパチニブによる手足症候群対策の保湿剤あり	
		 (day1-21)レンパチニブ錠内服	
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ライン確保用 ★パル輸液セット使用★ ---①	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペムブロリズマブ点滴静注 200mg 1日1回 注入時間 30分 ★パル輸液セット使用★ ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③	
処方	処方	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g 2本 ぬり薬 1日2回 部位手・足	
		 (day1-21)レンパチニブ錠内服	

□免疫チェックポイント阻害薬等の有害事象への対応

- 間質性肺疾患 …………… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …………… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …………… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …………… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …………… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …………… 倦怠感が発現することがある。
- 高血圧 …………… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(レンパチニブ)
- タンパク尿 …………… 定期的尿検査を行う。(レンパチニブ)
- 鼻血 …………… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(レンパチニブ)