

		1病日	8病日	15病日	28病日
休業完了	休業完了				休業完了
文書作成	文書	休業完了28日目			
		外 118 乳癌 Bev/PAC がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 アルコール過敏症確認			
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★パル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★パル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	実施確認：未 点滴末梢 メイン グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL 1袋 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 2A 1日1回 点滴速度 208ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★パル輸液セット使用★ ★ジフェンヒドラミン内服確認★	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 90mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用★ ---②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 90mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用★ ---②	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 パクリタキセル注 90mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間 ★パル輸液セット使用★ ---②	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 10mg/kg 1日1回 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 注入時間 1時間30分 ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---③	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 ペバシズマブ点滴静注用 10mg/kg 1日1回 ★初回90分、2回目60分、 それ以降30分に変更可能 注入時間 1時間30分 ---③	
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ---④	
		一般注射			
処方	処方	ジフェンヒドラミン錠 10mg 5錠 血管確保前に服用			
			ジフェンヒドラミン錠 10mg 5錠 血管確保前に服用		
				ジフェンヒドラミン錠 10mg 5錠 血管確保前に服用	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ペバシズマブ)
- タンパク尿 …… 定期的に尿検査を行う。(ペバシズマブ)
- 鼻血 …… 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ペバシズマブ)
- 末梢神経障害 …… 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。(パクリタキセル)
- 関節痛・筋肉痛 …… 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うこともある。(パクリタキセル)