

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		
		外 32 乳癌 EC がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 ★ファシール輸液セット使用★		
注射	抗がん剤	実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロ/セトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 ファモチジン注射液 20mg 2mL 1A d-α-トルフェニラミン注5mg 0.5% 1mL 1A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---① ↓ ★プラネクタ 2個 使用 ★ ★★アプレビタント(125mg)服用確認★★ ★ファシール輸液セット使用★		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 ★①の点滴の側管より同時に全開で ★ルトは後でE.L.ビッド投与に使用★ ---②		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 注射用シクロホスファミド 600mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★ファシル・スパイクセット使用★ 注入時間 1時間 ---③		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚糖液 5% 100mL 1瓶 エビルピシン塩酸塩注射液 90mg/m <sup>2</sup> 1日1回 ★シクロホスファミドの側管より同時に全開 ★投与側の腕を温める ---④		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 ★エビルピシン終了後全開で ★終了後もラインははずさない★ ---⑤		
		実施確認：未 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 400ml/h 注入時間 15分 ★ファシル・スパイクセット使用★ ---⑥		
	一般注射			
処方	処方		デキサメタゾン錠 4mg 2錠 ファモチジンD錠 20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 4日分 抗がん剤点滴翌日より内服	
		アプレビタントカプセルセット 1セット 1日1回、1回1錠 1日目、125mgを使用 2日目以降、80mgを午前中に服用		

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。  
好中球減少 …… 感染症予防のために外出だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。  
脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。  
出血性膀胱炎 …… 排尿時に痛みが出たり、残尿感等の症状があらわれることがある。(シクロホスファミド)