

		1病日	2病日	21病日
休薬完了	休薬完了			休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目 外 83 乳癌 DOC/CPA がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書 ★ファシール輸液セット使用★		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 アロキシ静注 0.75mg 5mL 1瓶 ガスター注射液 20mg 2mL 1A デキサメタゾン注射液 3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 220ml/h 注入時間 30分 ---① ★ファシール輸液セット使用★		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 ドセタキセル点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間 ★ファール・スリットセット使用★ ---②		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 注射用シクロfosファミド 600mg/m <sup>2</sup> 1日1回 注入時間 1時間 ★ファール・スリットセット使用★ ---③		
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 ★ファール・スリットセット使用★ ---④		
	一般注射			
処方	処方		デカドロン錠 4mg 2錠 ファモチジン錠 20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分 抗がん剤翌日より内服	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のがいがいをする。  
 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗いうがいを頻回に行う。  
 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。  
 爪の変形 …… 繰り返し点滴することにより爪の変形や変色が起こることがある。清潔に保ち、強い力をかけないようにする。(ドセタキセル)  
 浮腫 …… 繰り返し点滴することにより顔や足に浮腫が起こることがある。(ドセタキセル)