

		1病日	3病日	14病日
休業完了	休業完了			休業完了
文書作成	文書	休業完了14日目 外 105 大腸癌 mFOLFOX6 がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書		
注射	抗がん剤	実施確認：未・ ワンシヨット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間確認 ---①		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 ---② ルート確保用		
		実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③ ルートは後でレボホリナート投与に使用		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 85mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 レボホリナートと同時に投与 ---④		
		実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚糖液5%250mL 1袋 レボホリナート点滴静注用 200mg/ml 1日1回 注入時間 2時間 林カリアラチンと同時に投与 ---⑤		
		実施確認：未・ 点滴中心静脈 メイン 側管1 大塚生食注 50mL 1瓶 フルオロウラシル注 400mg/ml 1日1回 注入時間 5分 急速投与 ---⑥		
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 20mL 20mL フルオロウラシル注 2400mg/ml 1日1回 注入時間 46時間 ---⑦ インフューザーポンプ ★フルオロウラシル 投与量別希釈表参照★		
	携帯ポンプ			
一般注射			ワンシヨット中心静脈 補助1側管1 大塚生食注 20mL 1A	

副作用への対応  
 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。  
 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。  
 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。  
 口内炎 …… 予防のために食後の菌磨き、頻回のがういをする。  
 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。  
 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。  
 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。(オキサリプラチン)  
 アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。(オキサリプラチン)