

		1病日	2病日	15病日	21病日
休薬完了	休薬完了				休薬完了
文書作成	文書	休薬完了21日目		S-1休薬	
		外 140 胃癌 G-SOX がん薬物療法の副作用についての説明書・同意書			
注射	抗がん剤	S-1 14日分 体表面積で変更			
		実施確認：未・ ワンショット中心静脈 補助1 側管 1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 ポート針、刺入時間通確認！ ---①			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 血管確保用 ---②			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 パロノセトロン静注0.75mg 5mL 1瓶 デキサメタゾン注射液3.3mg 1mL 3A 1日1回 点滴速度 216ml/h 注入時間 30分 ---③			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚糖液5%250mL 1袋 オキサリプラチン注 100mg/m ² 1日1回 注入時間 2時間 ---④			
		実施確認：未・ 中心静脈 メイン 大塚生食注 50mL 1瓶 1日1回 点滴速度 600ml/h 注入時間 5分 フラッシュ用 ---⑤			
		実施確認：未・ ワンショット中心静脈 メイン 側管 1 大塚生食注 20mL 1A 1日1回 CVポート、セブタム洗浄用 ---⑥			
	一般注射				
処方	処方		デキサメタゾン錠4mg 2錠 ファモチジン錠20mg 2錠 1日2回 朝食後、16時 2日分		
		S-1：14日分 体表面積参照にて処方		S-1休薬開始	

副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなるがあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。
- 末梢神経障害 …… 冷感刺激を避けること（特に点滴後5日間程度）。治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。痛みを伴う場合は痛み止めを使うことがある。（オキサリプラチン）
- アレルギー反応 …… 治療を繰り返すことによってアレルギー反応を起こすことがある。（オキサリプラチン）
- 流涙 …… 防腐剤を含まない人工涙液を5～6回/日点眼する。（S-1）
- 手足症候群 …… 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤でも可。（S-1）