





		1病日	14病日
休薬完了	休薬完了		休薬完了
文書作成	文書	 休薬完了14日目 泌尿器科 腎癌 Avelumab+Axitinib がん化学・免疫療法の副作用についての説明書・同意書  アベルマブ投与30分前：抗ヒスタミン剤・解熱鎮痛剤服用  アキシチニブ錠 10mg/day 連日内服	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★バル輸液セット使用★ ☆ゾリエト・アトアミノアト内服確認☆ ---①	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 250mL 1袋 アベルマブ点滴静注 10mg/kg 1日1回 注入時間 1時間30分 ★バル輸液セット使用★ ---②	
		実施確認：未・ 点滴末梢 メイン 大塚生食注 100mL 1瓶 1日1回 点滴速度 200ml/h 注入時間 30分 ★投与後、1時間は観察を十分に… ---③	
	一般注射		
処方	処方	アセトアミノフェン錠500mg 1錠 ジフェンヒドラミン錠10mg 3錠 1日1回  アキシチニブ錠 10mg/day 14日分処方	

□副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 …… 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 …… 便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は早めに使用する。
- 下痢 …… 便が緩くなることもあるので、排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 …… 予防のために食後の歯磨き、頻回のうがいをする。
- 好中球減少 …… 感染症予防のために外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回に行う。
- 脱毛 …… 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。
- 高血圧 …… 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(アキシチニブ)
- 免疫チェックポイント阻害薬の有害事象への対応
- 間質性肺疾患 …… 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 大腸炎 …… 腹痛を伴う粘液便、血便が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 1型糖尿病 …… 口や喉が渇き、水分摂取が普段より多い、尿量が普段より多い場合は速やかに病院に連絡する。
- 神経障害 …… 手足に力が入らない、食べ物が飲み込みにくい場合は速やかに病院に連絡する。
- 皮膚障害 …… 体に発疹が出ることもあるが、ひどい口内炎、まぶたや眼の充血を伴う場合は速やかに病院に連絡する。
- 内分泌障害 …… 倦怠感が発現することがある。